

	薬の名称	効果・効能	用い方	起床	朝	昼	夕	寝前	他	単位	備考
 白・錠 214	1:セレコックス錠100mg(28錠)	変形性関節症や腰痛症、肩関節の炎症や痛みを和らげます。	1日2回 朝・夕食後服用 14日分		1		1			錠	この薬の使用中にめまいやぼんやりするなどの症状が現われる場合があります。自動車の運転など危険を伴う作業をされる場合は注意してください。腹痛、下血、前胸部の圧迫感、息切れ、全身のむくみなどの症状が現われた場合は服用を中止し医師の診察を受けてください。 セレコックス錠100mgに後発品は存在しません。レバミピド錠100mg「EMEC」は後発品です。
 白・錠 レバミピド EMEC	2:レバミピド錠100mg「EMEC」(28錠)	胃潰瘍、胃炎のお薬です。胃粘膜の血流を良くしたり胃の粘液を増やすことで粘膜を保護、修復するので、胃潰瘍、胃炎の症状を改善します。	1日2回 朝・夕食後服用 14日分		1		1			錠	
 白～淡黄白・貼付剤	3:モーラスパップ30mg(12枚)	炎症によるはれをとり、痛みを和らげる貼り薬です。関節炎、筋肉痛、外傷後の腫れや痛みなどに用います。	1日2回 患部に貼付							枚	●患部がぬれている場合はよくふき取ってからお使い下さい。きずや湿疹がある所などには貼らないで下さい。★アスピリン喘息の方は通常使用できません。強いひざしをあげないようにご注意下さい。 モーラスパップ30mgは医師の指示により後発品への変更が行えません。モーラスパップ30mgには後発品が存在しますが、当薬局では取り扱っておりません。

特記事項

医薬品医療機器情報提供ホームページ
<http://www.info.pmda.go.jp/ippan.html>
 当薬局は「在宅患者訪問薬剤管理指導」届出薬局です。

お薬に関するお問い合わせ先

処方医: 鈴木整形外科
 鈴木 成典 先生

北栗コスモス薬局

TEL: 0263-40-4133 FAX: 0263-40-4134
 薬剤師: 牧田壽男

TEL: 0263-40-7766

緊急連絡先: 0263-40-4133

